

SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ

IDENTIFIER LES OISEAUX DU CAMPUS

réalisé par

Anaëlle Touillet-Le Masson

Kiana Luczkow

Rémi Giro

Anna Roux

Suzie Tallon





On me retrouve...



sur le campus



en campagne



en forêt

Tourterelle turque



Je suis la Tourterelle turque, *Streptopelia decaocto* !

Tu peux différencier assez facilement la Tourterelle turque du Pigeon ramier à son chant. Il faut tout simplement compter le nombre de syllabes du chant.

Le pigeon en a 5 et un chant avec des notes plus graves, tandis que la tourterelle en fait 3 et sur des notes un peu plus aiguës.



On me retrouve...



sur le campus



sur le littoral

Goéland Leucophée



Je suis le Goéland leucophée, *Larus michahellis* !

Il est très souvent aperçu en vol en nombre au-dessus de la fac. Prédateur, son alimentation est composée de poissons, d'oiseaux, d'œufs, de poussins, de petits mammifères, ou même de déchets ménagers !

Certains Goélands leucophées sont migrateurs et quittent la Méditerranée dès la fin de la saison de reproduction, pour rejoindre l'Atlantique ou la mer du Nord.



On me retrouve...



sur le campus



en campagne



en forêt

Pie bavarde



Je suis la Pie bavarde, *Pica pica* !

Cet oiseau commun est un Corvidé (de la même famille que les corbeaux). Comme son nom l'indique, la pie parle beaucoup ou plutôt, elle jacasse !

La pie, comme d'autres corvidés, peut être une vraie cleptomane : elle dérobe proies, branches ou encore des oeufs à d'autres oiseaux et mammifères. Ça s'appelle du cleptoparasitisme et c'est ce comportement qui lui a donné sa réputation de voleuse !

En Europe de l'Ouest, et notamment en France, elle tend à fortement régresser dans les campagnes et à devenir plus urbaine et péri-urbaine.



On me retrouve...



sur le campus



en campagne

Bergeronnette grise



Je suis la Bergeronnette grise, *Motacilla alba* !

Tu peux souvent l'apercevoir sur le sol à courir à toute berzingue puis s'arrêter et reprendre sa course à la poursuite d'insectes.

On peut aussi reconnaître son hochement de queue régulier, comme le Rougequeue noir. Elle a un vol très ondulant et un cri de vol très caractéristique.



On me retrouve...



sur le campus



en forêt

Mésange charbonnière



Je suis la Mésange charbonnière, *Parus Major* !

Tu peux l'entendre chanter tout le printemps à la fac. Son chant est plutôt facile à reconnaître, une fois que tu l'as dans l'oreille, tu ne pourras plus te tromper ! Elle occupe la plupart des nichoirs de la fac. C'est une espèce cavernicole, c'est-à-dire qui fait son nid dans des cavités tel que le creux d'un arbre ou bien un nichoir.

Leurs œufs sont blancs tachetés de brun-rouge et les premiers viennent d'être pondus sur la fac début avril !



On me retrouve...



sur le campus



en campagne



en forêt

Fauvette à tête noire



Je suis la Fauvette à tête noire, *Sylvia atricapilla* !

Son doux chant flûté est très agréable. Il faut savoir qu'elle adore imiter le chant d'autres espèces pour étaler toutes ses compétences et séduire sa partenaire.

C'est une migratrice partielle : certains restent au même endroit toute l'année alors que d'autres migrent. Le réchauffement climatique et le nourrissage aux mangeoires permettent aux fauvettes de rester hiverner en Europe centrale. Ces changements de migration vont jusqu'à transformer la morphologie de l'oiseau. Les fauvettes devenues sédentaires ont un bec plus pointu, et des ailes plus rondes alors que celles qui migrent vers le Sud gardent des ailes plus allongées, facilitant les vols longs, et le bec plus large pour consommer des fruits.



On me retrouve...



sur le campus



en campagne



en forêt

Rougegorge familier



Je suis le Rougegorge familier, *Erithacus rubecula* !

De la famille des Muscicapidés, il s'agit avant tout d'un oiseau de la forêt bien que l'on peut fréquemment le retrouver dans les jardins et les villes à la mauvaise saison.

Peu farouche, il s'approche souvent lorsque l'on jardine, à l'affût des malheureux vers de terre qui se trouveraient hors du sol.
Son chant mélancolique se fait souvent entendre.



On me retrouve...



sur le campus



en forêt

Perruche à collier



Je suis la Perruche à collier, *Psittacula krameri* !

Elle est naturellement répartie sur les zones tropicales même si on la retrouve désormais introduite aux quatre coins du monde.

Il y a un dimorphisme sexuel au niveau de la tête et du cou. Le mâle se distingue de la femelle à sa gorge noire se prolongeant sur les côtés du cou en un mince collier souligné de rose. La femelle en est dépourvue.

On la retrouve souvent à nicher sur des platanes. Cet oiseau grégaire se regroupe en dortoir à la tombée du jour et le matin les perruches se séparent en petit groupe pour se nourrir.



On me retrouve...



sur le campus



en campagne



en forêt



dans des haies

Chardonneret élégant



Je suis le Chardonneret élégant, *Carduelis carduelis* !

C'est un granivore : il se nourrit de graines très diverses, que ce soit de plantes herbacées, notamment de chardons d'où il tire son nom mais également d'arbres.

De la famille des Fringilles, il migre en groupe avant de se séparer pour trouver un territoire où nicher.

Connu pour la beauté de son plumage et de son chant, il a été longtemps prisé en tant qu'oiseau de cage. Il est aujourd'hui protégé mais malgré ce statut, le braconnage de cet oiseau est fréquent dans de nombreux pays méditerranéens.



On me retrouve...



sur le campus



en forêt

Roitelet à triple bandeau



Je suis le Roitelet à triple-bandeau , *Regulus ignicapilla* !

Il est de la famille des Régulidés, qui sont de tout petits passereaux insectivores de l'hémisphère nord.

Avec son congénère «huppé», il est l'un des plus petits oiseaux d'Europe.

Ils ne pèsent que 5 à 5,5 grammes.

Il s'agit d'un insectivore exclusif , que l'on retrouve dans les forêts sous climat tempéré et méditerranéen.



On me retrouve...



sur le campus



en forêt



dans des haies

Mésange à longue queue



Je suis la Mésange à longue queue, *Aegithalos caudatus* !

Elle ne fait pas partie de la même famille que les autres Mésanges, elle appartient à la famille des Aegithalidés alors que les « vraies » Mésanges sont de la famille des Paridés. Le nom de « Mésange » attribué à la Mésange à longue queue est purement vernaculaire et non scientifique : elle est désormais appelée Orite.

De ce fait, la Mésange à longue queue n'est pas cavernicole comme les Mésanges du genre des Paridés, mais elle construit son propre nid.



On me retrouve...



sur le campus



dans des haies

Serin cini



Je suis le Serin cini, *Serinus serinus* !

Son gazouillis métallique se fait entendre partout sur le campus mais difficile de l'apercevoir nettement. On distingue souvent seulement une petite boule jaune qui, associée à son chant, ne laisse aucun doute !

En vol c'est son croupion jaune qui se distingue en général. Le Serin aime les milieux semi-ouverts avec des arbres et arbustes, c'est pour cela qu'il apprécie aussi les milieux urbains avec des parcs et jardins.